

## National Early Warning Score 2 (NEWS2)

Fysiologiska parametrar	3	2	1	0	1	2	3
Andningsfrekvens	≤8		9–11	12–20		21–24	≥25
Syremättnad 1	≤91	92–93	94–95	≥96			
Syremättnad 2 (används på läkarordination*)	≤83	84–85	86–87	88–92	93–94 med syrgas	95–96 med syrgas	≥97 med syrgas
Tillförd syrgas		Ja		Nej			
Systoliskt blodtryck	≤90	91–100	101–110	111–219			≥220
Pulsfrekvens**	≤40		41–50	51–90	91–110	111–130	≥131
Medvetandegrad***				Alert			CVPU
Temperatur	≤35,0		35,1–36,0	36,1–38,0	38,1–39,0	≥39,1	

\* Syremättnad 2 används endast efter läkarordination vid låg habituell syremättnad t.ex. KOL

\*\* Om hjärtfrekvens mäts skall detta användas istället för pulsfrekvens i denna parameter

\*\*\* Medvetandegrad: A=alert, C=confusion (nyttillkommen eller förvärd förvirring), V=voice (reagerar med ögonöppning, tal eller rörelse vid tilltal/kraftiga tillrop), P=pain (reagerar vid smärtstimulering), U=unresponsive (reagerar ej vid tilltal/smärtstimulering)

Löf  
2018

Original: Royal College of Physicians (RCP). Översättning: Martin Spångfors 2018. Publicerat enligt riktlinjer RCP.

Atgärdsstrappa enligt NEWS2		Atgärd
NEWS	Övervakningsfrekvens	
0	Senast inom 12 timmar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätt övervaka NEWS enligt rekommenderad övervakningsfrekvens</li> </ul>
Totalt: 1–4	Senast inom 4–6 timmar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informera ansvarig sjuksköterska om NEWS-värdet</li> <li>Ansvarig sjuksköterska bedömer om övervakningsfrekvens ska ökas samt behov av läkarbedömning</li> </ul>
3 poäng i en parameter	Senast inom 1 timme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarig sjuksköterska ska informera ansvarig läkare</li> <li>Brådskande bedömning av ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande</li> <li>Avsteg från övervakningsfrekvens kan göras av ansvarig läkare efter bedömning av patient</li> </ul>
Totalt 5–6	Senast inom 1 timme	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart informera ansvarig läkare</li> <li>Brådskande bedömning av ansvarig läkare samt eventuellt team med kompetens i akut omhändertagande</li> <li>Övervåg vård med möjlighet till tät tillsyn och övervakning</li> <li>Avsteg från övervakningsfrekvens kan göras av ansvarig läkare efter bedömning av patient</li> </ul>
Totalt ≥7	Övervåg kontinuerlig övervakning	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ansvarig sjuksköterska ska omedelbart tillkalla ansvarig läkare</li> <li>Övervåg kontakt med intensivvårdskompetens t.ex. IIG</li> <li>Övervåg att flytta patienten till högre vårdnivå</li> </ul>

Original: Royal College of Physicians (RCP). Översättning: Martin Spångfors 2018. Publicerat enligt riktlinjer RCP.

