

Trakeotomi triagering

Riskparametrar	Grön	Orange	Röd
BMI *	<30	30–40	>40
Nackrörlighet	>30°	10–30°	<10°
Kragstorlek	<45 cm	45–50 cm	>50 cm
Blödningssjukdom	NEJ		JA
Antikoagulantia	NEJ	Bara ASA	JA
PK (INR)	INR <1,3	INR 1,3–1,5	INR >1,5
TPK	>150–350	50–150	<50
APT-tid	<40 s	40–60 s	>60 s
Syresättningsproblem	NEJ	NEJ med syrgas	JA
Svårtuberad	NEJ	NEJ med video-la-ryngo/bronkoskop	JA

* BMI räknas ut genom att man tar kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m²).

Risikfaktorer för svårintuberad patient

Risikparametrar	Grön	Röd
Begränsad gapförmåga	≥ 4 cm	<4 cm
Thyreomentalt avstånd (TMD) *	≥ 7 cm	<7 cm
Inskränkt nackrörlighet	NEJ	JA
Nackcirkumferens (NC) *	≤ 5	>5

* Neck Circumference/Thyreomentalt avstånd (NC/TMD) är ett index som vid värden >5 med hög sensitivitet kan förutse svår luftväg.